

Indeling van teeltlanden

De landen¹ waar maïs wordt geteeld, zijn ingedeeld in 3 risicocategorieën: Hoog, Gemiddeld en Laag. Deze classificatie wordt regelmatig gezamenlijk door een aantal voerregelingen uitgevoerd.

Bij het bepalen van de risicocategorie van een teeltland wordt rekening gehouden met de resultaten van aflatoxineanalyses die beschikbaar zijn in de GMP+ Monitoring Database en met de resultaten die door andere systemen zijn verzameld (QS, EFISC-GTP, OVOCOM, AIC). Naast deze resultaten kan ook andere relevante informatie worden gebruikt (bijv. RASFF-kennisgevingen, informatie over weer/oogstomstandigheden, enz. De criteria die bij de evaluatie zijn gebruikt worden in tabel 2 vermeld.

Tabel 1: Risicoclassificatie van teeltlanden

Publicatiedatum: 15 september 2026

Implementatiedatum: 18 september 2026 (datum monstername)

Hoog	Midden	Laag
Brazilië Servie Bulgarije Hongarije	- Alle overige landen die niet genoemd zijn als landen met Hoog of Laag risicoprofiel. - Zuid Frankrijk (departementen: 85, 79, 86, 17, 16, 87, 23, 19, 03, 63, 15, 43, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26, 24, 33, 40, 64, 47, 46, 82, 32, 65, 31, 81, 12, 09, 48, 30, 34, 11, 66, 05, 04, 06, 83, 84 en 13)	België Denemarken Duitsland Estland Finland Frankrijk (behalve departementen Zuid Frankrijk) Ierland IJsland Letland Litouwen Luxemburg Nederland Noorwegen Oekraïne Oostenrijk Polen Slowakije Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk Zweden

1. Indien van toepassing kan een land in verschillende regio's worden opgedeeld.

Tabel 2: Criteria voor (Her)classificatie van een teeltland

Risicoclassificatie per teeltland	% analyses per land (periode: 1 september tot evaluatiemoment)	Analyseresultaten (x)
Hoog	> 1%	> 20ppb; OF
	> 10%	10ppb < x ≤ 20ppb
Medium	Elk scenario dat niet onder Hoog of Laag wordt vermeld	
Laag	< 1%	5ppb < x ≤ 10ppb; EN
	> 90%	< 2ppb; EN
	Resterend (max 9%)	≤ 5ppb
a. Bij het opwaarderen van een teeltland naar een hoger risiconiveau is het aantal te testen monsters ten minste 1. b. Bij het degraderen van een teeltland naar een lager risiconiveau is het aantal te testen monsters minimaal 50 (nieuwe resultaten). c. Naast a. en b. kunnen andere relevante criteria en bronnen worden gebruikt om een land van herkomst te herclassificeren.		

Eerdere versies

- [Versie 20.07.2026](#)
- [Versie 23.06.2026](#)
- [Versie 23.01.2026](#)
- [Versie 10.11.2025](#)
- [Versie 04.09.2025](#)

We enable every company in the feed chain to take responsibility for safe and sustainable feed.

GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)

+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e. info@gmpplus.org

Disclaimer:

Deze publicatie is gemaakt in het Engels en vertaald in meerdere talen. In het geval van een conflict in interpretatie of discrepantie tussen de Engelse taal en een andere taal, prevaleert de Engelse taal.

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.